



Bác sĩ Thú y
TRẦN PHƯỚC KIM HÙNG
Mobile: 0919.906.246

Tiến sĩ
NGUYỄN NHƯ PHO
Mobile: 0908.032.133

Bác sĩ Thú y
TRƯƠNG NGUYỄN HUY CƯỜNG
Mobile: 0908.314.188

**BỘ PHẬN TƯ VẤN
KỸ THUẬT:**

18001536
(MIỄN PHÍ CUỘC GỌI)



Chứng Chỉ WHO - GMP
cho tất cả dây chuyền sản phẩm



Chứng Chỉ
ISO - IEC 17025



Chứng Chỉ Hàng Việt Nam
Chất Lượng Cao

QUY TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC ANOVA CHO



CÁ

QUY TRÌNH SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN WHO-GMP



CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH ANOVA

Số 36 Đại Lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, P. Bình Hòa,
Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: (0274) 3.782.770 - Fax: (0274) 3.782.700
E.mail: info@anova.com.vn - Website: http://www.anova.com.vn



I. QUY TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC ANOVA CHO CÁ NUÔI AO

(QUY TRÌNH SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN WHO-GMP)

giai đoạn	Chỉ định	Sản phẩm	Liều lượng và cách dùng	Ghi chú
Chuẩn bị ao	Xử lý môi trường nguồn nước ao trước khi thả cá	AVAXIDE	1ml/ m³ nước ao.	Xử lý 3 ngày trước khi thả nuôi.
		ZEOFISH	1kg/ 250m³ nước ao	Xử lý 1 ngày trước khi thả nuôi.
Cá giống trước khi thả nuôi	Ngoại ký sinh trùng: Trùng mô neo, rận cá, trùng bánh xe, các loại sán lá.	SEAWEED hoặc NOVA-ECTOCIDE	Dùng liều theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.	Tắm cá trong 25-30 phút.
	Bị vết thương, xây xát ngoài da do đánh bắt, vận chuyển.	Sử dụng 1 trong các sản phẩm sau: NOVA-FLOR 500, NOVA-OXYTETRA 500	Sử dụng theo liều hướng dẫn trên nhãn.	Trộn cho ăn liên tục 3 ngày hoặc pha nước tắm cá.
3 tháng đầu sau khi nuôi	Ngoại ký sinh trùng.	SEAWEED hoặc NOVA-ECTOCIDE	Dùng liều theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.	Mỗi tuần xử lý 1 lần, trong 2 tuần. Cho ăn liên tục 2-3 ngày.
	Các bệnh do vi khuẩn: đốm đỏ, lở loét toàn thân, viêm ruột, gan sưng có mủ, phù đầu, trắng đuôi, sung chướng bụng, tuột nhớt, tuột vảy, xuất huyết ở da.	Sử dụng 1 trong các sản phẩm sau: NOVA-FLOR 500, NOVA-SULTRIM 240	Dùng theo liều ghi trên toa nhãn thuốc.	Phòng bệnh: 2 tuần cho ăn một đợt 2-3 ngày. Trị bệnh: dùng liên tục trong 5 ngày.
	Bệnh nấm da, nấm mang.	NOVADINE	2,5 lít/ 1.000 m³ nước ao.	Mỗi 2 tuần xử lý 1 lần.
	Cung cấp chất dinh dưỡng, tăng sức đề kháng và kích thích tăng trưởng.	Sử dụng kết hợp NOVA-C hoặc với một trong các thuốc bổ sau: NOVA-FM, NOVAMIX S, NOVA-PREMIX FOR FISH, NOVAZYME F	Trộn thuốc vào thức ăn.	Cho ăn liên tục.
	* Xổ giun, sán cho cá.	Dùng 1 trong các sản phẩm sau: -NOVA-PRAZIQUANTEL -NOVA-PARASITE	Trộn thuốc vào thức ăn theo liều trên nhãn sản phẩm.	Xổ vào tháng thứ 3.
	* Bỏ gan – phòng trị các bệnh về gan như: suy gan, mỡ vàng, thịt vàng, gan có mủ, viêm gan	Sử dụng 1 trong các sản phẩm sau: HEPATOL, NOVITOL, SORBIMIN, HEMAFISH	Trộn thuốc vào thức ăn.	Trộn cho cá ăn liên tục
	* Xử lý ao khi bị ô nhiễm.	Dùng một trong các sản phẩm sau: ZEOFISH, NOVA-NB 25, NOVA-YUCCA PLUS	Dùng theo liều hướng dẫn trên toa nhãn.	Định kỳ mỗi tháng xử lý 1 lần.
	* Ngoại ký sinh trùng.	SEAWEED hoặc NOVA-ECTOCIDE	Dùng liều theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.	Mỗi tuần xử lý 1 lần, trong 2 tuần.
	* Các bệnh do vi khuẩn: đốm đỏ, lở loét toàn thân, viêm ruột, gan sưng có mủ, phù đầu, trắng đuôi, sung chướng bụng, tuột nhớt, tuột vảy, xuất huyết ở da.	Sử dụng 1 trong các sản phẩm sau: COTRIMIN, NOVA-FLOR 5000, NOVA-OXYTETRA 500	Dùng theo liều hướng dẫn trên toa nhãn.	Phòng bệnh: Cứ 2 tuần cho ăn một đợt 2-3 ngày. Trị bệnh: dùng liên tục trong 5 ngày.
	* Bệnh nấm da, nấm mang.	NOVADINE	2,5 lít/ 1.000 m³ nước ao.	Mỗi 2 tuần xử lý 1 lần.
Từ tháng thứ 4 cho đến khi thu hoạch	Cung cấp chất dinh dưỡng, tăng sức đề kháng và kích thích tăng trưởng.	Sử dụng kết hợp NOVA-MINLEC FOR FISH hoặc NOVA-C với một trong các loại sau: PROBIO FISH, NOVAZYME F, NOVA-ANTI SHOCK FISH, NOVA-BACILAC FISH	Trộn thuốc vào thức ăn.	Cho ăn liên tục đến khi xuất bán
	* Xổ giun, sán cho cá.	Chọn 1 trong 2 sản phẩm: -NOVA-PRAZIQUANTEL -NOVA-PARASITE	Trộn thuốc vào thức ăn theo liều trên nhãn sản phẩm.	Xổ vào lúc cá 6 tháng tuổi. Cho ăn ngày 1 lần vào củ sáng, trong 3-5 ngày liên tục.
	* Bỏ gan - Phòng trị các bệnh về gan như: suy gan, mỡ vàng, thịt vàng, gan có mủ, viêm gan	Sử dụng một trong các sản phẩm sau: HEPATOL, NOVITOL, HEMAFISH	Trộn thuốc vào thức ăn theo liều trên nhãn sản phẩm.	Trộn cho ăn liên tục.
	* Xử lý ao bị ô nhiễm.	Dùng một trong các sản phẩm sau: ZEOFISH, NOVA-NB 25, NOVA-YUCCA PLUS	Dùng theo liều hướng dẫn ghi trên toa nhãn.	Định kỳ mỗi tháng xử lý 1 lần.

II. QUY TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC ANOVA CHO CÁ NUÔI BÈ

(QUY TRÌNH SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN WHO-GMP)

giai đoạn	Chỉ định	Sản phẩm	Liều lượng và cách dùng	Ghi chú
Chuẩn bị bè	Xử lý bè trước khi thả cá	AVAXIDE	1 lít/ 100 m³ nước bè, xử lý trước khi thả nuôi 3 ngày	Dùng bạt che kín 4 phía, không cho nước lưu thông, ngâm bè trong 1 ngày, mở bạt cho nước mới vào trước khi thả cá.
Cá giống trước khi thả nuôi	Ngoại ký sinh trùng: Trùng mô neo, rận cá, trùng bánh xe, các loại sán lá ...	SEAWEED hoặc NOVA-ECTOCIDE	Dùng liều theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.	Dùng bạt che kín 1 đầu của bè hoặc xử lý khi nước đứng. Tắm cá trong 25-30 phút.
	Bị vết thương, xây xát ngoài da do đánh bắt, vận chuyển.	Sử dụng 1 trong các sản phẩm sau: NOVA-SULTRIM 240, FLOR 500 FOR FISH	Dùng liều theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.	Trộn cho ăn liên tục 3 ngày hoặc pha nước tắm cá.
3 tháng đầu sau khi thả nuôi	1. Ngoại ký sinh trùng	SEAWEED hoặc NOVA-ECTOCIDE	Dùng liều theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.	Dùng bạt che kín 1 đầu của bè hoặc xử lý khi nước đứng.
	2. Các bệnh do vi khuẩn: Đốm đỏ, lở loét, trắng đuôi, tuột nhớt, tuột vảy, phù đầu, xuất huyết, viêm ruột, gan sưng có mủ, sung chướng bụng ...	Dùng một trong các loại sau: FLOR 500 FOR FISH, COTRIMIN, NOVA-SULTRIM 240	Trộn thuốc vào thức ăn theo liều trên toa nhãn.	Phòng bệnh: Mỗi 2 tuần dùng một đợt thuốc 2 ngày. Trị bệnh: Dùng liên tục trong 5-7 ngày.
	3. Bệnh nấm da, nấm mang.	NOVADINE	2,5 lít/ 1.000m³ nước	Dùng bạt che kín một đầu của bè hoặc xử lý khi nước đứng.
	4. Tăng sức kháng bệnh và kích thích sinh trưởng trong quá trình nuôi.	Dùng kết hợp NOVA-C với 1 trong các sản phẩm sau: NOVA-ZYME F, NOVA-FM	Trộn vào thức ăn theo liều trên nhãn sản phẩm.	Dùng thường xuyên trong thức ăn
	5. Xổ giun, sán cho cá.	Dùng một trong các loại sau: - NOVA-PRAZIQUANTEL - NOVA-PARASITE	Trộn vào thức ăn theo liều trên nhãn sản phẩm.	Xổ vào lúc cá 3 tháng tuổi. Cho ăn ngày 1 lần vào củ sáng, trong 3-5 ngày liên tục.
	6. Bỏ gan – phòng trị các bệnh về gan như: suy gan, mỡ vàng, thịt vàng, gan có mủ, viêm gan	Sử dụng 1 trong các sản phẩm sau: HEPATOL, NOVITOL, SORBIMIN, HEMAFISH	Trộn vào thức ăn theo liều trên nhãn sản phẩm.	Trộn cho cá ăn liên tục.
Từ tháng thứ 4 cho đến khi thu hoạch	1. Ngoại ký sinh trùng.	SEAWEED hoặc NOVA-ECTOCIDE	Dùng liều theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.	Dùng bạt che kín 1 đầu của bè hoặc xử lý khi nước đứng.
	2. Các bệnh do vi khuẩn: Đốm đỏ, lở loét, trắng đuôi, tuột nhớt, tuột vảy, phù đầu, xuất huyết, viêm ruột, gan sưng có mủ, sung chướng bụng ...	Dùng một trong các loại sau: NOVA-FLOR 5000, COTRIMIN, NOVA-SULTRIM 240, NOVA-OXYTETRA 500	Trộn vào thức ăn theo liều trên nhãn sản phẩm.	Phòng bệnh: Cứ mỗi 2 tuần dùng một đợt thuốc 2 ngày. Trị bệnh: Dùng liên tục trong 5 ngày.
	3. Bệnh nấm da, nấm mang.	Dùng NOVADINE	Dùng liều theo hướng dẫn trên nhãn thuốc	Dùng bạt che kín một đầu của bè hoặc xử lý khi nước đứng.
	4. Tăng sức kháng bệnh và kích thích sinh trưởng trong quá trình nuôi, giảm tỷ lệ chết tăng năng suất.	Dùng kết hợp NOVA-C với 1 trong các sản phẩm sau: NOVA-MIX S, PROBIO FISH, NOVA-FM, NOVA- ANTI SHOCK FISH, NOVA-BACILAC FISH	Trộn thuốc vào thức ăn theo liều trên toa nhãn.	Dùng liên tục trong thức ăn cho đến khi thu hoạch.
	5. Xổ giun, sán cho cá.	Chọn 1 trong 2 sản phẩm: - NOVA-PRAZIQUANTEL - NOVA-PARASITE	Trộn thuốc vào thức ăn theo liều trên toa nhãn.	Xổ vào lúc cá 6 tháng tuổi. Cho ăn ngày 1 lần vào củ sáng, trong 3-5 ngày liên tục.
	6. Bỏ gan – phòng trị các bệnh về gan như: suy gan, mỡ vàng, thịt vàng, gan có mủ, viêm gan	Sử dụng 1 trong các sản phẩm sau: HEPATOL, NOVITOL, HEMAFISH	Trộn thuốc vào thức ăn theo liều trên toa nhãn.	Trộn cho cá ăn liên tục.

